



เฮอ์บากรีน®
ผลการทดสอบในมันสำปะหลัง



ซ้าย-กลาง : แปลงทดสอบที่เฮอ์บากรีน®



14-ก.ค.-53; พันธ์ เฮอ์บากรีนครั้งแรก



25-ส.ค.-53 มีการเจริญเติบโตดี



ไร่มันที่ไซ้

เฮอ์บากรีน

®

มีความสมบูรณ์



ฉีดพ่น เฮอร์บากรีน

ขณะที่มันสำปะหลังอายุ 4 เดือน



สภาพแปลงทดสอบ

5 สัปดาห์ต่อมา



สภาพแปลงทดสอบ
มันส้มปะหลังอายุได้ 6 เดือน



เปรียบเทียบมันส้มปะหลัง
อายุ 5 เดือน



ซ้าย-ขนาดหัวมันจากแปลงทั่วไป,
ขวา-ขนาดหัวมันที่ได้จากแปลงอร์บากรีน

®



ทำการฉีดพ่น 2 ครั้งใน
แปลงมันสัมปะหลังที่มีการระบาดเพลี้ยแป้ง



ขนาดหัวมันที่ปรับปรุงสภาพในแปลงที่เสียหาย



ขนาดหัวมันที่ใหญ่กว่า เมื่อไฮ้อร์บากรีน

®



ปริมาณหัวมัน เมื่อใช้ เฮอร์บากรีน

®



[ผลการเก็บเกี่ยว](#)

Last Update : 09-ธ.ค.-53

Language: ไทย | Size: 1.10 MB.



[เพ็ลี่ยแป้งโนมันส้มปะหลัง](#)

Last Update : 09-ธ.ค.-53

Language: ไทย | Size: 2.37 MB.



[ผลการเก็บเกี่ยวที่ อ. พนมทวน](#)

Last Update : 28-ม.ค.-54

Language: ไทย | Size: 515 KB.



[Back](#)